

附件 3（略）

附件 4（略）

附件 5

## 说明书和标签

### 一、盐酸聚六亚甲基双胍溶液说明书和标签

#### （一）盐酸聚六亚甲基双胍溶液说明书

兽用 外用

##### 【兽药名称】

通用名称：盐酸聚六亚甲基双胍溶液

商品名称：

英文名称：Poly (hexamethylenebiguanide) hydrochloride Solution

汉语拼音：Yansuan Juliyujiajishuangua Rongye

【主要成分】 聚六亚甲基双胍盐酸盐

【性状】 本品为无色至淡黄色液体。

【药理作用】 本品为阳离子表面活性剂，系广谱杀菌剂。吸附在带负电荷的细菌表面，阻止其分裂繁殖；同时通过跨膜运输作用于细胞质中的磷脂双分子层，与带负电磷酸基结合，从而改变了细胞膜的选择透过性，破坏细胞代谢，使细菌丧失活性。

【用途】 用于孵化鸡蛋的浸泡消毒。可有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌及肠炎沙门氏菌等。

【用法与用量】 以本品计。临用前用水按 1：（100～200）倍稀释，浸泡鸡蛋消毒时间不得少于 15 秒，晾干。

【不良反应】 按规定的用法与用量使用尚未见不良反应。

##### 【注意事项】

- 1 施药者应佩戴口罩、湿毛巾等防护用品。
- 2 稀释时避免使用铁和碳钢器具。
- 3 防止皮肤和眼睛接触到产品原液，如果溅入眼睛，应立即用大量水冲洗。
- 4 不得与肥皂及其他阴离子表面活性剂等合用。
- 5 本品为外用消毒剂，请勿内服。
- 6 应将本品置于儿童不可触及处。
- 7 如本品冻结，使用前应解冻，充分摇匀。

【休药期】 无需制定

【规格】 20%

【包装】

【贮藏】 密闭保存

【有效期】 24 个月

【批准文号】

【生产企业】

地址

## (二) 盐酸聚六亚甲基双胍溶液标签

兽用 外用

【兽药名称】

通用名称：盐酸聚六亚甲基双胍溶液

商品名称：

英文名称：Poly (hexamethylenebiguanide) hydrochloride Solution

汉语拼音：Yansuan Juliu yajia jishuanggua Rongye

【主要成分】 聚六亚甲基双胍盐酸盐

【性状】 本品为无色至淡黄色液体。

【用途】 用于孵化鸡蛋的浸泡消毒。可有效杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌及肠炎沙门氏菌等。

【用法与用量】 以本品计。临用前用水按 1：（100～200）倍稀释，浸泡鸡蛋消毒时间不得少于 15 秒，晾干。

【规格】 20%

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【休药期】 无需制定

【包装】

【贮藏】 密闭保存

【生产企业】

地址

## 二、鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9 亚型）、传染性法氏囊病四联灭活疫苗（La Sota 株+M41 株+cs 株+C13 株）说明书和标签

（一）鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9 亚型）、传染性法氏囊病四联灭活疫苗（La Sota 株+M41 株+cs 株+C13 株）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9 亚型）、传染性法氏囊病四联灭活疫苗（La Sota 株+M41 株+cs 株+C13 株）

商品名称：无

英文名称：Newcastle Disease, Infectious Bronchitis, Avian Influenza (Subtype H9) and Infectious Bursal Disease Vaccine, Inactivated (Strain La Sota+Strain M41+Strain cs+Strain C13)

汉语拼音：Ji Xinchengyi Chuanranxingzhiqiguanyan Qinliugan (H9 Yaxing) Chuanranxingfashinangbing Silian Miehuoyimiao (La Sota Zhu+M41 Zhu+cs Zhu+C13 Zhu)

**【主要成分与含量】** 疫苗中含灭活的鸡新城疫病毒 La Sota 株，灭活前每 0.1ml 含病毒液  $10^{9.2}$ EID<sub>50</sub>；灭活的鸡传染性支气管炎病毒 M41 株，灭活前每 0.2ml 含病毒液  $10^{7.2}$ EID<sub>50</sub>；灭活的禽流感（H9 亚型）病毒 cs 株，灭活前每 0.1ml 中含病毒液  $10^{9.2}$ EID<sub>50</sub>；灭活的鸡传染性法氏囊病病毒 C13 株，灭活前每 0.1ml 中含病毒液  $10^{8.3}$ TCID<sub>50</sub>。

**【性状】** 乳白色均匀乳剂。

**【作用与用途】** 预防鸡新城疫、鸡传染性支气管炎、H9 亚型禽流感和鸡传染性法氏囊病。免疫后 28 日产生保护，免疫期为 4 个月。

**【用法与用量】** 颈部皮下注射。1~4 周龄鸡，每只 0.3ml；4 周龄以上鸡，每只 0.5ml。

**【不良反应】** 一般无明显的不良反应。

**【注意事项】**

- 1 本品仅用于接种健康鸡群。
- 2 疫苗使用前应充分摇匀，并使疫苗恢复至室温。
- 3 疫苗开启后应限当日用完。
- 4 接种器具应无菌，注射部位应消毒。
- 5 用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

**【规格】**

**【包装】**

**【贮藏与有效期】** 2~8℃保存，有效期为 15 个月。

**【批准文号】**

**【生产企业】**

**仅在兽医指导下使用**

**（二）鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9 亚型）、传染性法氏囊病四联灭活疫苗（La Sota 株+M41 株+cs 株+C13 株）内包装标签**

**兽用**

**鸡新城疫、传染性支气管炎、禽流感（H9 亚型）、传染性法氏囊病四联灭活疫苗  
（La Sota 株+M41 株+cs 株+C13 株）**

批准文号：

批 号：

有效期至：

【作用与用途】 详见说明书。

【用法与用量】 颈部皮下注射。1~4 周龄鸡，每只 0.3ml；4 周龄以上鸡，每只 0.5ml。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为 15 个月。

【生产企业】

**仅在兽医指导下使用**

### 三、高致病性猪繁殖与呼吸综合征、猪瘟、猪伪狂犬病三联活疫苗

(TJM-F92 株+C 株+Bartha-K61 株，悬浮培养) 说明书和标签

(一) 高致病性猪繁殖与呼吸综合征、猪瘟、猪伪狂犬病三联活疫苗 (TJM-F92 株+C 株+Bartha-K61 株，悬浮培养) 说明书

**兽用**

【兽药名称】

通用名称：高致病性猪繁殖与呼吸综合征、猪瘟、猪伪狂犬病三联活疫苗 (TJM-F92 株+C 株+Bartha-K61 株，悬浮培养)

商品名称：无

英文名称：Highly Pathogenic Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, Classical Swine Fever Vaccine, Pseudorabies, Live (Strain TJM-F92+Strain C+Strain Bartha-K61, Suspension Culture)

汉语拼音：Gaozhibingxingzhufanzhiyuhuxizonghezheng, Zhuwen, Zhuweikuangquanbing Sanlian Huoyimiao (TJM-F92 Zhu+C Zhu+Bartha-K61 Zhu, Xuanfupeiyang)

【主要成分与含量】 疫苗中含高致病性猪繁殖与呼吸综合征病毒弱毒 TJM-F92 株，每头份病毒含量应不低于  $10^{5.0}$ TCID<sub>50</sub>；含猪瘟兔化弱毒 (C 株) 传代细胞毒，每头份病毒含量应不低于  $10^{4.0}$ FAID<sub>50</sub>；含伪狂犬弱毒 Bartha-K61 株，每头份病毒含量应不低于  $10^{5.0}$ TCID<sub>50</sub>。

【性状】 白色或黄白色海绵状疏松团块，易与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解。

【作用与用途】 用于预防高致病性猪繁殖与呼吸综合征、猪瘟和猪伪狂犬病。免疫产生期为免疫后14日；免疫期为6个月。

【用法与用量】 颈部肌肉注射。用于断奶仔猪或 4 周龄及以上健康猪只，按标签注明头份，用灭菌生理盐水将疫苗稀释成 1 头份/ml，每头接种 1.0ml。

【不良反应】 接种后，个别情况下可能会出现过敏反应，若发生这种情况，可用肾上腺素进行抢救，并采取治疗措施。

【注意事项】

- 1 高致病性猪繁殖与呼吸综合征阴性猪群、种猪和怀孕母猪禁用。
- 2 疫苗经稀释后应充分摇匀，限 1 次用完。
- 3 应使用无菌注射器进行接种。
- 4 注射部位应严格消毒。

5 用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

6 如果动物处于某些传染性疾病的潜伏期、营养不良、有寄生虫感染、处于运输或环境应激状态下或存在免疫抑制，或者未按说明书进行接种，均可能引起免疫失败。

**【规格】** (1) 5 头份/瓶 (2) 10 头份/瓶 (3) 20 头份/瓶 (4) 50 头份/瓶 (5) 100 头份/瓶

**【包装】** 10 瓶/盒

**【贮藏与有效期】** 2~8℃保存，有效期为 24 个月。

**【批准文号】**

**【生产企业】**

**仅在兽医指导下使用**

(二) 高致病性猪繁殖与呼吸综合征、猪瘟、猪伪狂犬病三联活疫苗 (TJM-F92 株+C 株+Bartha-K61 株，悬浮培养) 内包装标签

**兽用**

高致病性猪繁殖与呼吸综合征、猪瘟、猪伪狂犬病三联活疫苗  
(TJM-F92 株+C 株+Bartha-K61 株，悬浮培养)

5 (10、20、50、100) 头份/瓶

批准文号:

批 号:

有效期至:

**【作用与用途】** 详见说明书。

**【用法与用量】** 颈部肌肉注射。用于断奶仔猪或 4 周龄及以上健康猪只，按标签注明头份，用灭菌生理盐水将疫苗稀释成 1 头份/ml，每头接种 1.0ml。

**【贮藏与有效期】** 2~8℃保存，有效期为 24 个月。

**【生产企业】**

**仅在兽医指导下使用**