

附件 3 略

附件 4 略

附件 5

说明书和标签

一、鸡传染性喉气管炎活疫苗（LT-IVAX 株）说明书和标签

（一）鸡传染性喉气管炎活疫苗（LT-IVAX株）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：鸡传染性喉气管炎活疫苗（LT-IVAX株）

商品名称：爱乐啼

英文名称：Fowl Laryngotracheitis Vaccine, Modified Live Virus

汉语拼音：Ji Chuanranxinghouqiguanyan Huoyimiao (LT-IVAX Zhu)

【主要成分与含量】 含鸡传染性喉气管炎病毒LT-IVAX株应不低于 $10^{2.7}$ EID₅₀/羽份。

【性状】 灰白色海绵状疏松团块，易与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解。

【作用与用途】 用于预防鸡传染性喉气管炎。

【用法与用量】 按瓶签注明羽份进行稀释，点眼接种，每只1羽份。一般选一侧眼，接种1滴。适用于4周龄或4周龄以上的鸡。一般在4周龄时进行首次接种，10周龄时加强接种1次。

【不良反应】 一般无可见的不良反应。

【注意事项】 1.仅用于接种4周龄或4周龄以上健康鸡。在传染性喉气管炎暴发时，应首先对健康鸡进行接种，再顺次推向发病区。

2.接种前、后，应做好鸡舍环境卫生管理和消毒工作，降低空气中细菌密度，以减轻眼部感染。

3.接种本疫苗的前、后3日内，应避免接种鸡新城疫和传染性支气管炎单苗或联苗。

4.稀释后的疫苗应放冷暗处，并在2小时内用完。

5.用过的疫苗瓶和稀释后未用完的疫苗应焚毁。

6.疫苗中含有庆大霉素。

7.屠宰前21日内禁用。

【规格】 1000羽份/瓶

【包装】 10瓶/盒

【贮藏与有效期】 2~8°C保存，有效期为36个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【企业名称】 英特威国际有限公司 (Intervet International B.V.)

【生产厂名称】 英特威美国分公司 (Intervet Inc.)

地址：29160 Intervet Lane, Millsboro, Delaware, USA

仅在兽医指导下使用

（二）鸡传染性喉气管炎活疫苗（LT-IVAX株）标签

兽用

爱乐啼
鸡传染性喉气管炎活疫苗（LT-IVAX株）

1000羽份/瓶

《进口兽药注册证书》证号：

批号：

有效期至：

【作用与用途】 用于预防鸡传染性喉气管炎。

【用法与用量】 按瓶签注明羽份进行稀释，点眼接种，每只1羽份。详见说明书。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为36个月。

【企业名称】 英特威国际有限公司（Intervet International B.V.）

【生产厂名称】 英特威美国分公司（Intervet Inc.）

地址：29160 Intervet Lane, Millsboro, Delaware, USA

仅在兽医指导下使用

二、猪支原体肺炎灭活疫苗（J株）说明书和标签

（一）猪支原体肺炎灭活疫苗（J株）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：猪支原体肺炎灭活疫苗（J 株）

商品名称：安百克

英文名称：Mycoplasma Hyopneumoniae Bacterin

汉语拼音：Zhu Zhiyuantifeiyan Miehuoyimiao (J Zhu)

【主要成分与含量】 疫苗中含灭活的猪肺炎支原体 J 株，每头份相对效力 (RP 值) ≥1.0。

【性状】 淡粉红色乳剂。

【作用与用途】 用于预防猪支原体肺炎。

【用法与用量】 皮下或肌肉注射，两次接种。建议首次接种在 7~10 日龄左右，首免后 2 周加强免疫，每次注射 1ml/头份，随后每半年用 1ml 剂量加强免疫 1 次。

【不良反应】 正常使用，一般无不良反应。个别猪可能会出现过敏反应，可用肾上腺素等抗过敏性药物对症治疗。

【注意事项】 1.切忌冻结和高温加热，亦不可经阳光照射。

2.疫苗使用前应充分摇匀并平衡至室温。

3.开启疫苗瓶后应一次用完。

4.屠宰前 21 日内禁用。

5.疫苗中含有氨苄西林、庆大霉素和硫柳汞作为防腐剂。

6.注射本油乳剂疫苗时应特别小心，避免注射到自己的手指或手。意外注射可引起严重的局部反应。如果发生意外注射，应立即就医。

【规格】 (1) 50ml/瓶 (2) 100ml/瓶

【包装】 (1) 40 瓶/箱 (2) 50 瓶/箱

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为 24 个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【企业名称】 莱特威国际有限公司 (Intervet International B.V.)

【生产厂名称】 莱特威美国分公司 (Intervet Inc.)

地址: 21401 West Center Road, Elkhorn, Nebraska, USA

仅在兽医指导下使用

(二) 猪支原体肺炎灭活疫苗 (J 株) 标签

兽用

安百克

猪支原体肺炎灭活疫苗 (J 株)

50 (100) ml/瓶

《进口兽药注册证书》证号:

批号:

有效期至:

【作用与用途】 用于预防猪支原体肺炎。

【用法与用量】 皮下或肌肉注射,两次接种。建议首次接种在 7~10 日龄左右,首免后 2 周加强免疫,每次注射 1ml/头份,随后每半年用 1ml 剂量加强免疫 1 次。

【贮藏与有效期】 2~8°C 保存,有效期为 24 个月。

【企业名称】 莱特威国际有限公司 (Intervet International B.V.)

【生产厂名称】 莱特威美国分公司 (Intervet Inc.)

地址: 21401 West Center Road, Elkhorn, Nebraska, USA

仅在兽医指导下使用

三、盐酸头孢噻呋注射液说明书和标签

(一) 盐酸头孢噻呋注射液说明书

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称: 盐酸头孢噻呋注射液

商品名称: 速解灵

英文名称: Ceftiofur Hydrochloride Injection

汉语拼音: Yansuan Toubaosaifu Zhushey

【主要成分】 盐酸头孢噻呋

【性状】 本品振摇后,应呈不透明的白色至灰白色混悬液,偶带粉色或黄色。

【药理作用】 药效学 头孢噻呋属 β -内酰胺类抗生素,能够抑制细菌细胞壁的合成而导致细菌死亡,具有广谱杀菌作用。对革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌均有效。体外条件下已证实对胸膜肺炎放线杆菌、多杀性巴氏杆菌、溶血性曼氏杆菌、睡眠嗜血杆菌、坏死梭杆菌和产黑色素拟杆菌等均具有抗菌作用。

药动学 牛 盐酸头孢噻呋按2.2mg/kg的剂量给牛经颈部肌内注射或皮下注射,吸收迅速,血药峰浓度C_{max}分别为9.25±1.73μg/ml和9.19±1.65μg/ml,药时曲线下面积AUC_{0-LOQ}分别为88.5±17.0μg·h/ml和91.0±20.2μg·h/ml,达峰时间T_{max}分别为1.73±0.49小时和2.25±0.87小时,半衰期t_{1/2}短,分别为29.3±7.4小时和32.9±6.9小时,血浆浓度达0.2μg/ml的时间(t_{-0.2})分别为41.2±6.1小时和41.5±7.3小时。在牛体内代谢物大部分通过尿液排泄,

少部分通过粪便排泄。

猪 盐酸头孢噻呋按5.0mg/kg的剂量给猪经颈部肌内注射，吸收迅速，血药峰浓度C_{max}为19.7±3.39μg/ml，药时曲线下面积AUC_{0-LOQ}为263±54.8μg·h/ml，达峰时间T_{max}为1.5±0.73小时，半衰期t_{1/2}短，为20.0±1.82小时，血浆浓度达0.2μg/ml的时间(t_{0.2})为82.5±10.5小时。生物利用度和注射用头孢噻呋钠(100%)相当。在猪体内代谢物大部分通过尿液排泄，少部分通过粪便排泄。

【适应证】 用于治疗由坏死性梭杆菌和产黑色素拟杆菌感染引起的牛急性腐蹄病；用于治疗猪细菌性呼吸道疾病。

【用法与用量】 以头孢噻呋计。

牛 肌内或皮下注射：每1kg体重，1.1~2.2mg，一日1次，连用3日。如果牛用药3次后效果不理想，可继续用药2日。

猪 肌内注射：每1kg体重，3~5mg，一日1次，连用3日。

【不良反应】 1.按推荐用法与用量使用时无严重不良反应。牛和猪偶见皮肤红斑、注射部位肿胀、变硬和局部组织刺激性反应，牛可在3日内恢复，猪可在14日内恢复。

2.高度敏感牛和猪会出现过敏反应。

【注意事项】 1.请在兽医指导下使用。

2.使用前充分摇匀。

3.不宜冷冻。

4.请置于儿童不可触及处。

5.有青霉素和头孢菌素类药物过敏史的操作人员禁止接触本品。

6.牛的每个注射点的用量不得超过15ml；猪的每个注射点的用量不得超过5ml。

7.如发现说明书中未提及的严重不良反应或症状，请咨询兽医。

【休药期】 牛4日，弃奶期12小时；猪4日。

【规格】 按C₁₉H₁₇N₅O₇S₃计算 (1) 100ml: 5g (2) 250ml: 12.5g

【包装】

【贮藏】 密闭保存

【有效期】 24个月；首次开启后为42日。

【《进口兽药注册证书》证号】

【企业名称】 硕腾公司(Zoetis Inc.)

【生产厂家名称】 硕腾公司美国卡拉玛祖生产厂(Zoetis LLC, Kalamazoo, USA)

地址：2605 East Kilgore Road, Kalamazoo, Michigan, 49001, USA

(二) 盐酸头孢噻呋注射液标签

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称：盐酸头孢噻呋注射液

商品名称：速解灵

英文名称：Ceftiofur Hydrochloride Injection

汉语拼音：Yansuan Toubaosaifu Zhushey

【主要成分】 盐酸头孢噻呋。

【性状】 本品振摇后，应呈不透明的白色至灰白色混悬液，偶带粉色或黄色。

【适应证】 用于治疗由坏死性梭杆菌和产黑色素拟杆菌感染引起的牛急性腐蹄病；用于治

疗猪细菌性呼吸道疾病。

【用法与用量】 以头孢噻呋计。

牛 肌内或皮下注射：每 1kg 体重，1.1~2.2mg，一日 1 次，连用 3 日。如果牛用药 3 次后效果不理想，可继续用药 2 日。

猪 肌内注射：每 1kg 体重，3~5mg，一日 1 次，连用 3 日。

【规格】 按 C₁₉H₁₇N₅O₇S₃ 计算 (1) 100ml : 5g (2) 250ml : 12.5g

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【休药期】 牛 4 日，弃奶期 12 小时；猪 4 日。

【包装】

【贮藏】 密闭保存

【企业名称】 硕腾公司 (Zoetis Inc.)

【生产厂名称】 硕腾公司美国卡拉玛祖生产厂 (Zoetis LLC. Kalamazoo, USA)

地址：2605 East Kilgore Road, Kalamazoo, Michigan, 49001, USA

四、盐酸贝那普利片说明书和标签

(一) 盐酸贝那普利片说明书

宠物用

【兽药名称】

通用名称：盐酸贝那普利片

商品名称：伏泰康

英文名称：Benazepril Hydrochloride Tablets

汉语拼音：Yansuan Beinapuli Pian

【主要成分】 盐酸贝那普利

【性状】 本品为米色至浅棕色椭圆形双面刻痕片。

【药理作用】 药效学 血管紧张素转化酶抑制剂。盐酸贝那普利为一种前体药物，在体内水解为活性物质贝那普利拉。贝那普利拉是一种高效的选择性血管紧张素转化酶抑制剂，可阻止无活性的血管紧张素 I 转化为有活性的血管紧张素 II，抑制醛固酮合成，从而降低血管紧张素 II 与醛固酮介导的效应，包括动脉与静脉血管收缩、肾脏水钠潴留及重吸收（包括病理性心肌肥大和肾退行性病变）。本品对心力衰竭的犬具有降压与减轻心脏负荷的作用，可改善其临床症状（例如减轻咳嗽、增强食欲等），延长心力衰竭患犬的寿命。

本品对犬血管紧张素转化酶具有持续抑制作用，最大抑制力高达 95% 以上，并且显著药效（大于 80%）可持续 24 小时。

药动学 内服给药后，贝那普利迅速吸收并被水解为活性物质贝那普利拉。贝那普利拉在给药后约 1.25 小时达到血浆峰值，并呈双相消除，初始半衰期为 1.7 小时，终末半衰期为 19 小时。贝那普利、贝那普利拉与血浆蛋白广泛结合，结合率为 85~90%；在组织中，主要分布于肝脏与肾脏。多次给药可导致贝那普利拉在血液中轻微蓄积，一般 4 天内达到稳定状态。贝那普利拉在犬体内经胆汁和泌尿途径排泄，分别为 54% 和 46%。肾功能损伤不会影响犬对贝那普利拉的排泄，因此，对于肾功能不全的患犬，无需调整给药剂量。

【适应证】 用于治疗犬充血性心力衰竭。

【用法与用量】 以盐酸贝那普利计。内服：每 1kg 体重，犬 0.25~0.5mg，每日 1 次，或按下列推荐用量使用。可同食物一起喂服，也可单独喂服。本品适口性良好，大多数犬可自主采食。

犬体重 (kg)	>5~10	>10~20	>20~40	>40~80
标准剂量	1/2 片	1 片	2 片	4 片

在治疗过程中，如临床有必要，在兽医的建议下剂量可加倍。需遵兽医医嘱用药。

【不良反应】 1. 犬对盐酸贝那普利耐受良好，少数犬可能出现短暂性呕吐、运动失调或疲劳症状。

2. 某些慢性肾病的患犬，血液中的肌酐水平可能轻度升高。这可能是药物的降压作用引起的，无需停止治疗，除非犬表现出其他不良反应。

【注意事项】 1. 请勿用于对本品活性成分或辅料过敏的犬。

2. 请勿用于低血压（血压过低）、血容量不足（血容量过低）、低钠血症或急性肾功能衰竭的犬。

3. 请勿用于因主动脉或肺动脉瓣狭窄引发的心脏输出障碍的犬。

4. 本品对妊娠期或哺乳期犬的安全性尚不确定，不得用于妊娠期或哺乳期的犬。

5. 未明确对体重不足 2.5kg 犬的疗效和安全性。

6. 对于慢性肾病的患犬，建议在治疗期间监测血浆肌酐、尿素和红细胞水平。

7. 服药过量可能引起短暂的可逆性低血压（血压过低），建议用温生理盐水静脉滴注。

8. 给药后请洗手。

9. 若施药人员误食，应立即就医，并出示产品标签或说明书。

10. 研究发现血管紧张素转化酶抑制剂可能影响胎儿发育，孕妇应避免误食。

11. 置于儿童无法触及处。

12. 未用的半片药物应放回泡罩及药盒内，半片药物的有效期为 2 天。

13. 应根据当地要求对未用药品或本品使用过程中产生的废弃物进行处置。

【休药期】 无需制定。

【规格】 5mg

【包装】

【贮藏】 在 25°C 以下贮存。

【有效期】 36 个月

【《进口兽药注册证书》证号】

【企业名称】 美国礼蓝动物保健有限公司 (Elanco Animal Health Incorporated)

【生产厂名称】 美国礼蓝动物保健有限公司法国生产厂 (Elanco France)

地址：26 RUE DE LA CHAPELLE, 68330 HUNINGUE, FRANCE

(二) 盐酸贝那普利片标签

宠物用

【兽药名称】

通用名称：盐酸贝那普利片

商品名称：伏泰康

英文名称：Benazepril Hydrochloride Tablets

汉语拼音：Yansuan Beinapuli Pian

【主要成分】 盐酸贝那普利

【性状】 本品为米色至浅棕色椭圆形双面刻痕片。

【适应证】 用于治疗犬充血性心力衰竭。

【用法与用量】 以盐酸贝那普利计。内服：每1kg体重，犬0.25~0.5mg，每日1次，或按表推荐用量使用。可同食物一起喂服，也可单独喂服。本品适口性良好，大多数犬可自主采食。

犬体重(kg)	>5~10	>10~20	>20~40	>40~80
标准剂量	1/2片	1片	2片	4片

在治疗过程中，如临床有必要，在兽医的建议下剂量可加倍。需遵兽医医嘱用药。

【规格】 5mg

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【休药期】 无需制定。

【贮藏】 在25℃以下贮存。

【包装】

【企业名称】 美国礼蓝动物保健有限公司(Elanco Animal Health Incorporated)

【生产厂名称】 美国礼蓝动物保健有限公司法国生产厂(Elanco France)

地址：26 RUE DE LA CHAPELLE, 68330 HUNINGUE, FRANCE

五、过硫酸氢钾复合物粉说明书和标签

(一) 过硫酸氢钾复合物粉说明书

兽用 外用

【兽药名称】

通用名称：过硫酸氢钾复合物粉

商品名称：卫可

英文名称：Compound Potassium Peroxymonosulphate Powder

汉语拼音：Guoliusuanqingjia Fuhewu Fen

【主要成分】 过硫酸氢钾、氯化钠

【性状】 本品为浅红色颗粒状粉末，有柠檬气味。

【药理作用】 本品在水中经过链式反应连续产生次氯酸、新生态氧，氧化和氯化病原体，干扰病原体的DNA和RNA合成，使病原体的蛋白质凝固变性，进而干扰病原体酶系统的活性、影响其代谢，增加细胞膜的通透性，造成酶和营养物质流失、病原体溶解破裂，进而杀灭病原体。

【用途】 用于畜禽舍、空气和饮用水等的消毒。防治水产养殖鱼、虾的出血、烂鳃、肠炎等细菌性疾病。

【用法与用量】 以本品计。浸泡或喷雾：1.畜舍环境消毒、饮水设备消毒、空气消毒、终末消毒、设备消毒、孵化场消毒、脚踏盆消毒，1:200浓度稀释。2.饮用水消毒，1:1000

浓度稀释。3.特定病原体消毒：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、猪水泡病病毒、传染性法氏囊病病毒，1：400 浓度稀释；链球菌，1：800 浓度稀释；禽流感病毒，1：1600 浓度稀释；口蹄疫病毒，1：1000 浓度稀释。4.水产养殖鱼、虾消毒：1：200 浓度稀释；全池均匀喷洒，每 1m³ 水体 0.6~1.2g。

【不良反应】 按推荐的用法与用量使用，未见不良反应。

【注意事项】 1.现用现配。

2.不得与碱类物质混存或合并使用。

3.产品用尽后，包装不得随意丢弃，应进行无害化处理。

【休药期】 无需制定。

【规格】 有效氯不少于 10.0%

【包装】 1kg/桶，5kg/桶，10kg/桶

【贮藏】 密闭，阴凉干燥处保存。

【有效期】 36 个月

【《进口兽药注册证书》证号】

【企业名称】 安德国际有限公司（Antec International Limited）

【生产厂名称】 英国安德国际有限公司（Antec International Limited）

地址：Windham Road, Chilton Industrial Estate, Sudbury, Suffolk CO10 2XD, United Kingdom

（二）过硫酸氢钾复合物粉标签

兽用 外用

【兽药名称】

通用名称：过硫酸氢钾复合物粉

商品名称：卫可

英文名称：Compound Potassium Peroxymonosulphate Powder

汉语拼音：Guoliusuanyingjia Fuhewu Fen

【主要成分】 过硫酸氢钾、氯化钠

【性状】 本品为浅红色颗粒状粉末，有柠檬气味。

【用途】 用于畜禽舍、空气和饮用水等的消毒。防治水产养殖鱼、虾的出血、烂鳃、肠炎等细菌性疾病。

【用法与用量】 以本品计。浸泡或喷雾：1.畜舍环境消毒、饮水设备消毒、空气消毒、终末消毒、设备消毒、孵化场消毒、脚踏盆消毒，1：200 浓度稀释。2.饮用水消毒，1：1000 浓度稀释。3.特定病原体消毒：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、猪水泡病病毒、传染性法氏囊病病毒，1：400 浓度稀释；链球菌，1：800 浓度稀释；禽流感病毒，1：1600 浓度稀释；口蹄疫病毒，1：1000 浓度稀释。4.水产养殖鱼、虾消毒：1：200 浓度稀释；全池均匀喷洒，每 1m³ 水体 0.6~1.2g。

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【休药期】 无需制定。

【包装】

【贮藏】 密闭，阴凉干燥处保存。

【企业名称】 安德国际有限公司 (Antec International Limited)

【生产厂名称】 英国安德国际有限公司 (Antec International Limited)

地址: Windham Road, Chilton Industrial Estate, Sudbury, Suffolk CO10 2XD, United Kingdom

六、烯丙孕素内服溶液说明书和标签

(一) 烯丙孕素内服溶液说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称: 烯丙孕素内服溶液

商品名称: 律期媒

英文名称: Altrenogest Oral Solution

汉语拼音: Xibingyunsu Neifurongye

【主要成分】 烯丙孕素

【性状】 本品为黄色澄清油状液体。

【药理作用】 药效学 性激素类药。烯丙孕素与天然黄体酮的作用类似,给药期间能够抑制脑垂体分泌促性腺激素,阻止卵泡发育及发情;给药结束后,脑垂体恢复分泌促性腺激素,促进卵泡发育及发情。停药时卵泡发育程度一致,加上促性腺激素的分泌同步恢复,促使所有动物在停药5~8日后同期发情。

药动学 本品在胃肠道迅速吸收,首次给药1小时后达到血药浓度峰值,第18次给药约4小时后达到血药浓度峰值。烯丙孕素主要经肝脏代谢,通过胆汁排出,消除半衰期约14个小时。

【适应证】 用于控制后备母猪同期发情。

【用法与用量】 以烯丙孕素计。直接用5ml喷头饲喂或喷洒在饲料上内服,一次量,后备母猪20mg(5ml),连用18日。

【不良反应】 给药量不足可能导致卵泡囊肿。

【注意事项】 1.仅用于至少发情过一次的性成熟的母猪。

2.每头动物单独给药,确保每日给药剂量。

3.有子宫内膜炎的母猪慎用;妊娠期和泌乳期母猪不得使用。

4.操作时应穿戴防护服和手套,操作后和用餐前应洗手。应选择防水的乳胶手套,以防本品沾染皮肤并通过皮肤吸收;如本品进入手套内,应立即脱掉手套并洗手。

5.妊娠和育龄妇女应避免接触本品,如须操作应非常小心。意外接触可能导致月经紊乱或妊娠期延长,所以应尽量避免皮肤直接接触,如意外渗漏至皮肤,应立即用肥皂和水清洗。若不慎入眼,请用清水彻底冲洗15分钟,必要时请及时就医。

6.疑似或患有孕酮依赖性肿瘤或血栓栓塞性疾病的人请勿接触本品。

7.瓶子开启后90日内有效,逾期未用完药物应废弃。

8.喷洒在饲料上内服时,应尽快饲喂完含本品的饲料。如有剩余应按废弃物遵循当地法规做无害化处理。

【休药期】 猪9日。

【规格】 1000ml:4g

【包装】

【贮藏】 25℃以下保存

【有效期】 36个月

【《进口兽药注册证书》证号】

【企业名称】 莱特威国际有限公司 (Intervet International B.V.)

【生产厂名称】 莱特威国际有限公司法国厂 (Intervet Productions)

地址: Rue De Lyons, 27460 Igoville, France

(二) 烯丙孕素内服溶液标签**兽用****【兽药名称】**

通用名称: 烯丙孕素内服溶液

商品名称: 律期媒

英文名称: Altrenogest Oral Solution

汉语拼音: Xibingyunsu Rongye

【主要成分】 烯丙孕素

【性状】 本品为黄色澄清油状液体。

【适应证】 用于控制后备母猪同期发情。

【用法与用量】 以烯丙孕素计。直接用 5ml 喷头饲喂或喷洒在饲料上内服，一次量，后备母猪 20mg (5ml)，连用 18 日。

【规格】 1000ml : 4g

【《进口兽药注册证书》证号】**【生产日期】****【生产批号】****【有效期】 至**

【休药期】 猪 9 日。

【包装】

【贮藏】 25℃以下保存

【企业名称】 莱特威国际有限公司 (Intervet International B.V.)

【生产厂名称】 莱特威国际有限公司法国厂 (Intervet Productions)

地址: Rue De Lyons, 27460 Igoville, France

七、癸甲溴铵溶液说明书和标签**(一) 癸甲溴铵溶液说明书****兽用 外用****【兽药名称】**

通用名称: 癸甲溴铵溶液

商品名称:

英文名称: Deciquam Solution

汉语拼音: Guijiaxiuan Rongye

【主要成分】 癸甲溴铵

【性状】 本品为无色至微黄色澄清黏稠液体，振摇时有泡沫产生。

【药理作用】 本品为双链季铵盐消毒剂，对多数细菌、真菌、病毒和藻类有杀灭作用。其在溶液状态时，可解离出季铵盐阳离子，与细菌胞浆膜磷脂中带负电荷的磷酸基结合，低浓度呈抑菌作用，高浓度起杀菌作用。溴离子使分子的亲水性和亲脂性剧增，能迅速渗透到胞浆膜脂质层及蛋白质层，改变膜的通透性，达到杀菌作用。本品残留药效强，对光和热稳定，其表面活性功能使药物可以渗透到缝隙和裂纹中，对金属、塑料、橡胶和其他物质均无腐蚀性。

【用途】 用于动物厩舍、饲喂器具消毒。

【用法与用量】 以癸甲溴铵计。动物厩舍、器具消毒：0.015%～0.05%。

【不良反应】 按照推荐的用法与用量使用，暂未见不良反应。

【注意事项】 1. 使用时小心操作。

2. 原液对皮肤和眼睛有轻微刺激，避免与眼睛、皮肤和衣服直接接触，如溅及眼睛和皮肤，立即以大量清水冲洗至少15分钟。

3. 内服有毒性，一旦误服立即饮用大量清水或牛奶，并尽快就医。

4. 置于儿童不可触及处。

【休药期】 无需制定。

【规格】 (1) 100ml : 50g (2) 100ml : 10g

【包装】

【贮藏】 遮光，密封保存。

【有效期】 24个月

【《兽药注册证书》证号】

【企业名称】 中国派斯德股份有限公司

【生产厂名称】 中国派斯德股份有限公司

地址：中国台湾桃园市中坜区合定路12号

(二) 癸甲溴铵溶液标签

兽用 外用

【兽药名称】

通用名称：癸甲溴铵溶液

商品名称：

英文名称：Deciquam Solution

汉语拼音：Guijiaxiuan Rongye

【主要成分】 癸甲溴铵

【性状】 本品为无色至微黄色澄清黏稠液体，振摇时有泡沫产生。

【用途】 用于动物厩舍、饲喂器具消毒。

【用法与用量】 以癸甲溴铵计。动物厩舍、器具消毒：0.015%～0.05%。

【规格】 (1) 100ml : 50g (2) 100ml : 10g

【《兽药注册证书》证号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【休药期】 无需制定。

【包装】

【贮藏】 遮光，密封保存。

【企业名称】 中国派斯德股份有限公司

【生产厂名称】 中国派斯德股份有限公司

地址：中国台湾桃园市中坜区合定路 12 号