

附件 2 略

附件 3 略

附件 4

说明书和标签

一、盐酸右美托咪定注射液说明书和标签

(一) 盐酸右美托咪定注射液说明书

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称：盐酸右美托咪定注射液

商品名称：多咪静

英文名称：Dexmedetomidine Hydrochloride Injection

汉语拼音：Yansuan Youmeituomiding Zhushuye

【主要成分】 盐酸右美托咪定

【性状】 本品为无色澄明液体。

【药理作用】 拟肾上腺素类药。右美托咪定是一种高特异的 α_2 -肾上腺素受体激动剂。 α_2 -肾上腺素受体的激活能在多个器官与组织中产生多种反应,通过抑制去甲肾上腺素释放降低交感神经的活性,产生镇静和止痛作用,这些作用的深度和过程与药物浓度相关。右美托咪定对其它中枢抑制剂(如麻醉剂)具有显著的增效作用,并能够显著减少麻醉剂的用量。按照推荐剂量的右美托咪定进行麻醉前给药可以减少插管法注射用药剂量的30%~60%。按照推荐剂量的右美托咪定可以减少吸入麻醉药物浓度的40%~60%。麻醉药物的剂量可以根据病畜的反应进行滴加。

【适应证】 用于犬和猫的镇静和止痛,常用于犬和猫临床检查、治疗、小手术和小的牙科处理。也可用于犬深度麻醉的麻醉前给药。

【用法与用量】 用于犬的镇静和止痛: 肌内注射 $500\mu\text{g}/\text{m}^2$ 或静脉注射 $375\mu\text{g}/\text{m}^2$, 具体见下表:

表1 犬的镇静/止痛剂量表: 根据犬体重进行静脉注射(IV)和肌内注射(IM)

犬体重 (kg)	静注右美托咪定 $375\mu\text{g}/\text{m}^2$		肌注右美托咪定 $500\mu\text{g}/\text{m}^2$	
	$\mu\text{g}/\text{kg}$	ml	$\mu\text{g}/\text{kg}$	ml
2~3	28.1	0.12	40.0	0.15
3~4	25.0	0.15	35.0	0.20
4~5	23.0	0.20	30.0	0.30
5~10	19.6	0.29	25.0	0.40
10~13	16.8	0.38	23.0	0.50
13~15	15.7	0.44	21.0	0.60

15~20	14.6	0.51	20.0	0.70
20~25	13.4	0.60	18.0	0.80
25~30	12.6	0.69	17.0	0.90
30~33	12.0	0.75	16.0	1.00
33~37	11.6	0.81	15.0	1.10
37~45	11.0	0.90	14.5	1.20
45~50	10.5	0.99	14.0	1.30
50~55	10.1	1.06	13.5	1.40
55~60	9.8	1.13	13.0	1.50
60~65	9.5	1.19	12.8	1.60
65~70	9.3	1.26	12.5	1.70
70~80	9.0	1.35	12.3	1.80
>80	8.7	1.42	12.0	1.90

用于犬的麻醉前给药：肌内注射 $125\mu\text{g}/\text{m}^2\sim 375\mu\text{g}/\text{m}^2$ 。麻醉前给药剂量根据手术过程和程度制定，也可按照麻醉制度确定。请参考下表进行剂量选择。

表2 犬的麻醉前给药剂量表：根据犬体重进行肌内注射（IM）

犬体重（kg）	肌注右美托咪定 $125\mu\text{g}/\text{m}^2$		肌注右美托咪定 $375\mu\text{g}/\text{m}^2$	
	$\mu\text{g}/\text{kg}$	ml	$\mu\text{g}/\text{kg}$	ml
2~3	9.4	0.04	28.1	0.12
3~4	8.3	0.05	25.0	0.15
4~5	7.7	0.07	23.0	0.20
5~10	6.5	0.10	19.6	0.29
10~13	5.6	0.13	16.8	0.38
13~15	5.2	0.15	15.7	0.44
15~20	4.9	0.17	14.6	0.51
20~25	4.5	0.20	13.4	0.60
25~30	4.2	0.23	12.6	0.69
30~33	4.0	0.25	12.0	0.75
33~37	3.9	0.27	11.6	0.81
37~45	3.7	0.30	11.0	0.90
45~50	3.5	0.33	10.5	0.99
50~55	3.4	0.35	10.1	1.06
55~60	3.3	0.38	9.8	1.13
60~65	3.2	0.40	9.5	1.19
65~70	3.1	0.42	9.3	1.26
70~80	3.0	0.45	9.0	1.35
>80	2.9	0.47	8.7	1.42

用于猫的镇静和止痛：肌内注射40 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 。下表为根据猫体重推荐使用右美托咪定的剂量。

表3 猫的镇静/止痛剂量表：根据猫体重进行肌内注射（IM）

猫体重（kg）	肌注右美托咪定	
	40 $\mu\text{g}/\text{kg}$	
	$\mu\text{g}/\text{kg}$	ml
2~3	40	0.2
3~4	40	0.3
4~6	40	0.4
6~7	40	0.5
7~8	40	0.6
8~10	40	0.7

【不良反应】 1.使用本品后，动物的血压会升高，随后会恢复正常或稍低于正常水平。也能导致呼吸频率减少和体温降低。体温降低的程度和过程与药物剂量相关。

2.使用本品后，可能会引起胃肠蠕动减慢，同时由于抑制胰岛素的释放导致血糖升高，从而引起尿量增加。

3.某些犬采用右美托咪定镇静后可能会出现本能性的肌肉收缩（颤搐）。

4. α_2 -肾上腺素受体激动剂可对猫的脑中枢产生刺激作用发生呕吐。

5.本品像所有的 α_2 -肾上腺素受体激动剂一样存在潜在的过敏反应，还可能出现反常反应（兴奋）。

6.本品与布托啡诺联用，或者以40 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 肌内注射后给予氯胺酮或异丙酚，有报道犬和猫会出现心律失常，如心动过缓或心动过速、房室传导阻滞、室性早搏等，兽医应注意监测。

【注意事项】 1.在使用本品前犬和猫应禁食12小时。

2.在药物作用和苏醒过程中，给药犬和猫应在恒温环境下保暖。

3.为防止镇静状态下由于黑暗反射引起的角膜干燥，可以使用润滑剂。

4.注射本品后，犬和猫应先休息15分钟；5~15分钟产生镇静及止痛作用，注射后15~30分钟达到最佳效果。

5.注意 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 剂量是随着体重的增加而减少。

6.不得用于存在如下情况的犬和猫，包括心血管病症、呼吸系统病症、肝肾病症或由炎热、寒冷或疲劳引起的条件性休克、重度虚弱或应激。

7.已知对右美托咪定或本品中任一辅料（羟苯甲酯或羟苯丙酯）过敏者禁用。

8.本品慎与抗胆碱药同用。

9.尚未对16周龄以下的犬和12周龄以下的猫进行右美托咪定的用药研究；尚未在雄性动物的繁育期开展安全性研究。

10.本品尚未在犬和猫的妊娠期、哺乳期开展安全性研究，因此不建议在该时期使用。

11.使用本品引发的不良反应可采用盐酸阿替美唑注射液（吡啶醒）进行救治，由于右美托咪定的镇静与止痛作用被逆转，恢复之后依然会有痛感，仍需要疼痛护理。

12.已被镇静的犬和猫在接触时要多加小心，任何操作或突然的刺激均可能引起看似深度镇静的犬和猫表现出具有攻击性的自我保护行为。

13.避免儿童接触本品。操作时应该特别小心，避免身体的任何部位直接接触本品。如不慎接触眼睛，立即用清水连续冲洗15分钟以上。如不慎接触皮肤，立即用肥皂水洗净，

并脱去被污染的衣物。局部接触、口腔接触或发生误注射均可引起相应反应，包括产生镇静、低血压以及心动过缓等症状，如发生上述情况应立即寻求医生诊治。

14.应在兽医指导下使用。

15.本品不可冷冻。

【休药期】 无需制定。

【规格】 10ml：5mg

【包装】

【贮藏】 遮光，常温密闭保存。

【有效期】 36个月；开启后有效期3个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【企业名称】 硕腾公司（Zoetis Inc.）

【生产厂名称】 芬兰Orion制药厂Espoo生产厂（Orion Corporation, Orion Pharma Espoo site）

地址：Orionintie 1, 02200 Espoo, Finland

（二）盐酸右美托咪定注射液标签

兽用处方药

【兽药名称】

通用名称：盐酸右美托咪定注射液

商品名称：多咪静

英文名称：Dexmedetomidine Hydrochloride Injection

汉语拼音：Yansuan Youmeituomiding Zhusheye

【主要成分】 盐酸右美托咪定

【性状】 本品为无色澄明液体。

【适应证】 用于犬和猫的镇静和止痛，常用于犬和猫临床检查、治疗、小手术和小的牙科处理。也可用作犬深度麻醉的麻醉前给药。

【用法与用量】 用于犬的镇静和止痛：肌内注射 500 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ 或静脉注射 375 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ ；用于犬的麻醉前给药：肌内注射 125 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ ~375 $\mu\text{g}/\text{m}^2$ ；用于猫的镇静和止痛：肌内注射 40 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 。

【规格】 10ml：5mg

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】 至

【休药期】 无需制定。

【包装】

【贮藏】 遮光，常温密闭保存。

【企业名称】 硕腾公司（Zoetis Inc.）

【生产厂名称】 芬兰Orion制药厂Espoo生产厂（Orion Corporation, Orion Pharma Espoo site）

地址：Orionintie 1, 02200 Espoo, Finland

二、复方制霉菌素软膏说明书和标签

(一) 复方制霉菌素软膏说明书

宠物用 外用药

【兽药名称】

通用名称：复方制霉菌素软膏

商品名称：耳肤灵

英文名称：Compound Nystatin Ointment

汉语拼音：Fufang Zhimeijunsu Ruangao

【主要成分】 制霉菌素、硫酸新霉素、氯菊酯、曲安奈德

【性状】 本品为淡黄色油膏。

【药理作用】 药效学 本品为抗细菌、皮质类固醇、抗真菌以及抗寄生虫活性成分组成的复方制剂。其中制霉菌素为抗真菌药，具有抗假丝酵母菌以及马拉色菌的活性；硫酸新霉素为氨基糖苷类抗生素，对革兰氏阴性需氧菌和葡萄球菌具有杀菌活性；氯菊酯为合成的拟除虫菊酯类杀螨剂和杀虫剂，通过作用于钠离子通道而阻断昆虫体内的神经冲动传导发挥作用；曲安奈德为合成的糖皮质激素，具有抗炎和抗瘙痒作用。

药动学 文献资料显示，健康皮肤对制霉菌素、新霉素和氯菊酯的吸收非常有限。不能排除曲安奈德的全身吸收。

【适应证】 用于治疗犬和猫对新霉素敏感的细菌、对制霉菌素敏感的真菌和对氯菊酯敏感的耳螨引起的混合型外耳炎。

【用法与用量】 以本品计。耳道外用：一次量 0.3g（约一粒豌豆大小），一日 1 次，连用 21 日。清洗外耳后，将本品挤入外耳道，轻轻按摩耳底部，并清洗耳廓黏附的多余软膏。

【不良反应】 1.非常罕见（<1/10000）出现对给药部位的刺激。如果刺激症状持续或加重应停药。

2.犬，尤其是老年犬，非常罕见（<1/10000）出现暂时性耳聋；猫非常罕见（<1/10000）出现神经系统症状，如共济失调和震颤。如果出现上述症状，应停药。

【注意事项】 1.不得用于鼓膜穿孔的犬猫；不得用于体重低于 1.5kg 的猫；不得用于妊娠或哺乳期犬猫。

2.为防止犬猫意外舔食，不要将软膏黏附到动物皮毛上。

3.健康的犬猫耳部以相当于推荐治疗剂量的 4 倍和推荐给药时间的 2 倍给予本品，会出现轻微刺激症状；猫偶尔会出现谷丙转氨酶（ALT）和谷草转氨酶（AST）升高，上述情况在停药后均可迅速恢复。

4.实验动物试验显示本品具有繁殖毒性和致畸作用，由于缺少靶动物研究资料，怀孕和哺乳期犬猫不得使用本品。

5.使用本品后应清洗双手。

6.本品如意外接触到眼睛，应立即用大量的水进行清洗；如意外接触到皮肤，应立即用大量的水和肥皂进行清洗。

7.人如误食本品，应立即就医并出示本品的外包装说明书。

8.对本品任何一种成分过敏的人员应避免接触本品。

9.置于儿童不可接触处。

10.废弃的包装或药物残留应进行无害化处理。

【休药期】 无需制定。

【规格】

- (1) 10g：制霉菌素 100 万单位+硫酸新霉素 3.5 万单位+氯菊酯 100mg+曲安奈德 10mg
(2) 30g：制霉菌素 300 万单位+硫酸新霉素 10.5 万单位+氯菊酯 300mg+曲安奈德 30mg

【包装】

【贮藏】 在不超过 25℃ 贮存。

【有效期】 36 个月；开启后 28 日。

【《进口兽药注册证书》证号】

【企业名称】 法国威隆制药股份有限公司（Vetoquinol S.A.）

【生产厂名称】 法国威隆制药股份有限公司（Vetoquinol S.A.）

地址：Magny Verneuil, 70200 Lure France

（二）复方制霉菌素软膏标签

宠物用 外用药

【兽药名称】

通用名称：复方制霉菌素软膏

商品名称：耳肤灵

英文名称：Compound Nystatin Ointment

汉语拼音：Fufang Zhimeijunsu Ruangao

【主要成分】 制霉菌素、硫酸新霉素、氯菊酯、曲安奈德

【适应证】 用于治疗犬和猫对新霉素敏感的细菌、对制霉菌素敏感的真菌和对氯菊酯敏感的耳螨引起的混合型外耳炎。

【用法与用量】 以本品计。耳道外用：一次量 0.3g（约一粒豌豆大小），一日 1 次，连用 21 日。清洗外耳后，将本品挤入外耳道，轻轻按摩耳底部，并清洗耳廓黏附的多余软膏。

【休药期】 无需制定。

【规格】

(1) 10g：制霉菌素 100 万单位+硫酸新霉素 3.5 万单位+氯菊酯 100mg+曲安奈德 10mg

(2) 30g：制霉菌素 300 万单位+硫酸新霉素 10.5 万单位+氯菊酯 300mg+曲安奈德 30mg

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【包装】

【贮藏】 在不超过 25℃ 贮存。

【企业名称】 法国威隆制药股份有限公司（Vetoquinol S.A.）

【生产厂名称】 法国威隆制药股份有限公司（Vetoquinol S.A.）

地址：Magny Verneuil, 70200 Lure France

三、复方非泼罗尼吡啶酮滴剂说明书和标签

（一）复方非泼罗尼吡啶酮滴剂说明书

宠物用 外用药

【兽药名称】

通用名称：复方非泼罗尼吡喹酮滴剂

商品名称：博来恩

英文名称：Compound Fipronil and Praziquantel Spot-on Solution

汉语拼音：Fufang Feipoluoni Bikuitong Diji

【主要成分】 非泼罗尼、甲氧普烯、乙酰氨基阿维菌素、吡喹酮。

【性状】 本品为无色至黄色或橙红色溶液。

【药理作用】 非泼罗尼是广谱杀虫药。与昆虫中枢神经细胞膜上的 γ -氨基丁酸（GABA）受体结合，关闭神经细胞的氯离子通道，从而干扰中枢神经系统的正常功能而导致昆虫死亡。主要通过胃毒和触杀起作用，也具有一定的内吸作用。

甲氧普烯是昆虫的生长调节剂（IGR），是昆虫保幼激素的同类物，对未成熟阶段昆虫的发育有抑制作用。这种药物与保幼激素的作用机制相类似，可导致昆虫发育受阻和发育阶段的跳蚤死亡。甲氧普烯对动物体上的卵的作用机制主要包括：通过直接渗透作用穿过卵壁进入新生跳蚤卵或者通过跳蚤成虫角质上皮的吸收而进入卵内。甲氧普烯对跳蚤幼虫和蛹的发育也有很强的抑制作用。

乙酰氨基阿维菌素对体内外寄生虫主要是体内线虫和节肢动物具有良好的驱杀作用。其驱虫作用机理在于促进触前神经元释放 γ -氨基丁酸（GABA），从而打开 GABA 介导的氯离子通道。乙酰氨基阿维菌素对无脊椎动物神经和肌肉细胞位于 GABA 介导点附近的谷氨酸介导的氯离子通道也具有选择性和高亲和力，从而干扰神经肌肉间的信号传递，使虫体松弛麻痹，导致虫体死亡或被排出体外。

吡喹酮具有广谱抗血吸虫和抗绦虫作用。对各种绦虫的成虫和幼虫具有良好的活性。吡喹酮对绦虫的准确作用机理尚未确定，但可能是与虫体包膜的磷脂相互作用，结果导致钠、钾离子流出。在体外低浓度的吡喹酮似可损伤绦虫的吸盘功能并兴奋虫体的蠕动，较高浓度药物则可增强绦虫链体（节片链）的收缩（在极高浓度时为不可逆转）。此外，吡喹酮可以引起绦虫包膜特殊部位形成灶性空泡，继而使虫体裂解。

【适应证】 用于预防和治疗猫跳蚤（猫栉首蚤，包括成虫、蛹、幼虫和卵）、蜱虫（鬃子硬蜱）感染，治疗胃肠道线虫（猫弓首蛔虫 L3 期、L4 期幼虫和成虫、狮弓蛔虫成虫、管形钩口线虫和锡兰钩口线虫 L4 期幼虫和成虫以及巴西钩口线虫成虫）、绦虫（犬复孔绦虫、巨颈带绦虫、多房棘球绦虫、帕氏乔伊绦虫成虫、富氏乔伊绦虫成虫）感染，并可用作辅助治疗跳蚤过敏性皮炎。

【用法与用量】 以本品计。外用：分开猫颈背部毛发成一线，将给药器中的全部药量分散滴至颈背部露出的皮肤上。体重小于 2.5kg 的猫使用 0.3 ml 滴管；体重为 2.5~7.5kg 的猫使用 0.9ml 滴管；体重 7.5kg 以上的猫可根据体重，将药管组合使用。每月给药 1 次。

【不良反应】 治疗后在用药部位可能发现一过性的毛发粘合和轻度一过性皮肤反应（瘙痒，脱毛发生率 $\leq 0.2\%$ ），不经治疗可自行恢复。如果猫在治疗后舔舐给药部位或经口摄入可能导致唾液分泌、呕吐或一过性神经症状（如瞳孔扩大，共济失调，定向障碍，冷漠）。这些表现可在 24 小时内消失，无需治疗即可缓解。

【注意事项】

- 1.不得用于患病（例如全身疾病、发热）或正在康复的猫。
- 2.7 周龄以下和/或体重小于 0.6kg 的猫、妊娠期和哺乳期内的猫未进行安全性研究，慎用。
- 3.滴于猫不易舔舐的颈背部皮肤，不应滴在毛发上以免影响疗效。

4. 治疗后待给药部位干燥再与动物接触。不建议猫在治疗后两日内洗澡，以免降低疗效。
5. 勿超剂量给药，重复用药间隔最短应 2 周以上。
6. 如果出现严重不良反应，应立即停止用药，并咨询兽医。
7. 使用本品时，使用者勿进食，喝水等。用药后及时用皂水洗手。
8. 未使用的药管应置于原外包装盒中，以便遮光；用完空管应妥善处理，勿弃于水塘，沟渠和河流内。
9. 本品应存放于儿童无法触及处。

【休药期】 无需制定。

【规格】

- (1) 0.3ml：非泼罗尼 24.9mg+甲氧普烯 30mg+乙酰氨基阿维菌素 1.2mg+吡喹酮 24.9mg
- (2) 0.9ml：非泼罗尼 74.7mg+甲氧普烯 90mg+乙酰氨基阿维菌素 3.6mg+吡喹酮 74.7mg

【包装】 (1) 1 管/盒 (2) 3 管/盒 (3) 4 管/盒 (4) 6 管/盒

【贮藏】 遮光，密封保存。

【有效期】 0.3ml 规格 24 个月；0.9ml 规格 36 个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【企业名称】 德国勃林格殷格翰动物保健有限公司 (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

【生产厂名称】 勃林格殷格翰动物保健有限公司法国吐鲁兹生产厂 (Boehringer Ingelheim Animal Health France)

地址：4 Chemin Du Calquet, 31000 Toulouse, FRANCE

(二) 复方非泼罗尼吡喹酮滴剂标签

宠物用 外用药

【兽药名称】

通用名称：复方非泼罗尼吡喹酮滴剂

商品名称：博来恩

英文名称：Compound Fipronil and Praziquantel Spot-on Solution

汉语拼音：Fufang Feipoluoni Bikuitong Diji

【主要成分】 非泼罗尼、甲氧普烯、乙酰氨基阿维菌素、吡喹酮。

【性状】 本品为无色至黄色或橙红色溶液。

【适应证】 用于预防和治疗猫跳蚤（猫栉首蚤，包括成虫、蛹、幼虫和卵）、蜱虫（鬃子硬蜱）感染，治疗胃肠道线虫（猫弓首蛔虫 L3 期、L4 期幼虫和成虫、狮弓蛔虫成虫、管形钩口线虫和锡兰钩口线虫 L4 期幼虫和成虫，以及巴西钩口线虫成虫）、绦虫（犬复孔绦虫、巨颈带绦虫、多房棘球绦虫、帕氏乔伊绦虫成虫、富氏乔伊绦虫成虫）感染，并可用作辅助治疗跳蚤过敏性皮炎。

【用法与用量】 以本品计。外用：分开猫颈背部毛发成一线，将给药器中的全部药量分散滴至颈背部露出的皮肤上。体重小于 2.5kg 的猫使用 0.3 ml 滴管；体重为 2.5kg~7.5kg 的猫使用 0.9 ml 滴管；体重 7.5kg 以上的猫可根据体重，将药管组合使用。每月给药一次。

【规格】

- (1) 0.3ml：非泼罗尼 24.9mg+甲氧普烯 30mg+乙酰氨基阿维菌素 1.2mg+吡喹酮 24.9mg
- (2) 0.9ml：非泼罗尼 74.7mg+甲氧普烯 90mg+乙酰氨基阿维菌素 3.6mg+吡喹酮 74.7mg

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】至

【休药期】 无需制定。

【贮藏】 遮光，密封保存。

【包装】 (1) 1管/盒 (2) 3管/盒 (3) 4管/盒 (4) 6管/盒

【企业名称】 德国勃林格殷格翰动物保健有限公司 (Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH)

【生产厂名称】 勃林格殷格翰动物保健有限公司法国吐鲁兹生产厂 (Boehringer Ingelheim Animal Health France)

地址: 4 Chemin Du Calquet, 31000 Toulouse, FRANCE

四、猪圆环病毒 1-2 型嵌合体、猪肺炎支原体二联灭活疫苗 (cPCV1-2 株+P-5722-3 株) 说明书和标签

(一) 猪圆环病毒 1-2 型嵌合体、猪肺炎支原体二联灭活疫苗 (cPCV1-2 株+P-5722-3 株) 说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称: 猪圆环病毒1-2型嵌合体、猪肺炎支原体二联灭活疫苗(cPCV1-2株+P-5722-3株)

商品名称: 瑞圆舒

英文名称: Porcine Circovirus Vaccine, Type1-Type 2 Chimera, Killed Virus, Swine *Mycoplasma Hyopneumoniae* Vaccine, Inactivated (Strain cPCV1-2+Strain P-5722-3)

汉语拼音: Zhu Yuanhuanbingdu Yi-er Xing Qianheti, Zhu Feiyanzhiyuanti Erlian Miehuoyimiao (cPCV1-2 Zhu+P-5722-3 Zhu)

【主要成分与含量】 每头份疫苗中含有猪圆环病毒1-2型嵌合体和猪肺炎支原体 (P-5722-3株) 抗原相对效力 (RP值) 不低于1.0。

【性状】 淡粉色至灰白色至浅褐色溶液。

【作用与用途】 用于预防猪圆环病毒2型引起的感染, 减少因猪肺炎支原体感染引起的肺炎。免疫产生期为21日, 猪圆环病毒病 (2型) 免疫期为23周, 猪支原体肺炎免疫期为16周。

【用法与用量】 用于3周龄或3周龄以上的健康猪。肌肉注射, 每头猪2ml。

【不良反应】 很少发生过敏反应, 必要时使用肾上腺素等脱敏措施抢救。

【注意事项】 1.仅用于接种健康猪。

2.切忌冻结。

3.使用前摇匀, 接种时注意无菌操作。

4.疫苗开封后, 应一次用完。

5.屠宰前21日内禁用。

6.疫苗中含有庆大霉素和硫柳汞。

7.用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

【规格】 (1) 10头份 (20ml) /瓶 (2) 50头份 (100ml) /瓶 (3) 250头份 (500ml) /瓶

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为24个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【企业名称】 硕腾公司（Zoetis Inc.）

【生产厂名称】 硕腾公司美国查理斯堡生产厂（Zoetis Inc. Charles City, USA）

地址：2000 Rockford Road, Charles City, Iowa, 50616, USA

仅在兽医指导下使用

（二）猪圆环病毒1-2型嵌合体、猪肺炎支原体二联灭活疫苗（cPCV1-2株+P-5722-3株）内包装标签

兽用

猪圆环病毒1-2型嵌合体、猪肺炎支原体二联灭活疫苗（cPCV1-2株+P-5722-3株）

瑞圆舒

10（50、250）头份/瓶

《进口兽药注册证书》证号：

批 号：

有效期至：

【作用与用途】 用于预防猪圆环病毒2型引起的感染，减少因猪肺炎支原体感染引起的肺炎。免疫产生期为21日，猪圆环病毒病（2型）免疫期为23周，猪支原体肺炎免疫期为16周。

【用法与用量】 用于3周龄或3周龄以上的健康猪。肌肉注射，每头猪2ml。

【贮藏与有效期】 2~8℃保存，有效期为24个月。

【企业名称】 硕腾公司（Zoetis Inc.）

【生产厂名称】 硕腾公司美国查理斯堡生产厂（Zoetis Inc. Charles City, USA）

地址：2000 Rockford Road, Charles City, Iowa, 50616, USA

仅在兽医指导下使用